

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антинуклеарные антитела (ANA) к 17 антигенам:			
Нуклеосомы	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Sm	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Sm/RNP	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Рибосомы	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Гистоны	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
U1-snRNP	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-A/Ro60	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-A/Ro52	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-B/La	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Scl-70	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
PM-Scl	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
CENT-A/B	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
PCNA	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Jo-1	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Митохондрии (AMA-M2)	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
f-Актин	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
DFS-70	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA)	4.30	Ед/мл	0.00-20.00
Антинуклеарный фактор (АНФ) на Нер-2 IgG	1/160	положительный	
Референсные значения:	<1/80 - отрицательный >=1/80 - положительный		
Тип свечения -Цитоплазматический (AC-15-23)			
Антинуклеарный фактор (АНФ) - группа антинуклеарных антител (АНА), определяемых методом непрямой иммунофлуоресценции (ИИФ). Данный метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью в отношении ряда аутоиммунных ревматических заболеваний. Клиническое значение имеют титры АНФ 1:80 и выше, что может указывать на наличие аутоиммунного заболевания, либо риск его развития при отсутствии клинических проявлений. Ложноположительные результаты при невысоких титрах АНФ (до 1:320) определяются у клинически здоровых людей, у лиц пожилого возраста - до 10% случаев. Также возможно повышение титров АНФ на фоне приема лекарственных препаратов (лекарственная волчанка). Для подтверждения положительного результата используются тесты, предназначенные для выявления антител к индивидуальным антигенам (ИФА, Вестерн-блот, лайн-блот). Цитоплазматический тип свечения (AC-15-23 по номенклатуре ICAP*) определяется при наличии антител к актину, тРНК-синтазам, в частности, Jo-1. Характерен для полимиозита, дерматомиозита, аутоиммунных заболеваний печени, первичного			

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: **-**

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
билиарного цирроза, системной красной волчанки (СКВ). *ICAP - Международный консенсус по паттернам антинуклеарных антител.			
Пример результата			

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2