

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**
Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**
Адрес: **Отправка не нужна**
Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**
Отделение **3021 Медицинский центр «М»**
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **29/05/2018**
Дата доставки материала: **29/05/2018**
Номер заказа: **97791111111**
Номер образца: **97791111111**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к эндомизину класса IgA (АЭА)	титр <1:5 - отрицательный		
Антитела к эндомизину класса IgG (АЭА)	титр <1:5 - отрицательный		
Примечание: Антитела к эндомизину класса IgA не обнаружены, что с вероятностью 95-98% исключает диагноз целиакии, при условии наличия глютеносодержащих продуктов в рационе питания обследуемого (рекомендации Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN, 2019) и клинические рекомендации Союза педиатров России (2016)). При интерпретации результата данного теста необходимо учитывать общий уровень иммуноглобулина IgA в сыворотке крови, возраст пациента и прием иммуносупрессивных препаратов. У пациентов с низким уровнем IgA (<0,2 г/л) для диагностики целиакии рекомендуется определение антител класса IgG к тканевой трансглутаминазе 2. Основным антигеном антител к эндомизину является белок тканевая трансглутаминаза 2 типа. Она играет значительную роль в увеличении сродства глиадина (глютена) к молекулам HLA-DQ2/DQ8, что приводит к активации иммунитета и последующему повреждению эпителиоцитов слизистой оболочки кишечника, к продукции антител к глиадину, тканевой трансглутаминазе 2 и эндомизину, которые попадают в системную циркуляцию и могут быть выявлены при проведении серологического исследования. Отсутствие антител к эндомизину (АЭА) класса IgG снижает вероятность целиакии, при условии, что на момент обследования обследуемый не находился на безглютеновой диете т.е. получал обычную пищу богатую глиадином. Этот тест рекомендуется проводить при подозрении на селективный дефицит IgA, поскольку позволяет исключить целиакию у лиц с селективным иммунодефицитом IgA, у которых целиакия выявляется сравнительно часто.			

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**
Стр. 1 из 2